

IDENTIFICATION DE LA PATIENTE

Nom : Nom de naissance :
 Prénom : Date de naissance :/...../.....
 Adresse : Lieu de naissance :
 N° Sécurité Sociale :
 Ville : Adresse mail :
 Code Postal : N° de téléphone :

ORIGINE DU PRÉLÈVEMENT

☐ Cervico-vaginal ☐ Autoprélèvement vaginal
☐ Vulvaire ☐ Vaginal Date :/...../.....
 Prélevé par : Heure :h.....

TRANSMISSION DES RÉSULTATS

☐ Mail / Serveur
☐ Au laboratoire
☐ Courrier

INDICATIONS PRÉANALYTIQUE

Préconisations à respecter avant le prélèvement (recommandation de la société française de microbiologie et du REMIC) :

- Eviter toute toilette intime, tout traitement local (crème,...) ainsi que tout rapport sexuel dans les 24h précédant le prélèvement.
- Eviter le prélèvement pendant la période menstruelle car la flore est modifiée, sauf indication contraire du prescripteur.
- Le prélèvement doit être réalisé avant ou à distance de tout traitement antibiotique (>15 jours pour les Chlamydiae et 5 jours pour les germes banals)

CONTEXTE CLINIQUE

Grossesse : ☐ Oui ☐ Non ☐ Post partum Date d'accouchement :/...../.....
☐ 1^{er} Trimestre ☐ 2^{ème} Trimestre ☐ 3^{ème} Trimestre ☐ Ménopause
☐ DIU (Dispositif Intra Utérin) ☐ Menace accouchement prématuré
☐ Recherche de germe particulier :
Attention : pour la recherche d'Herpès ou HPV, demandez un écouvillon et milieu adapté.
☐ Frottis inflammatoire
☐ Bilan IST ☐ Bilan AMP

SIGNES CLINIQUES

☐ Brûlures / Démangeaisons ☐ Douleurs abdominales / Ballonnements
☐ Ulcération / Vésicules ☐ Sécheresse vaginale

Pertes vaginales à détailler ci-dessous :

☐ Anormalement abondantes
☐ Blanchâtres ☐ Présence de sang ☐ Jaunâtres
☐ Malodorantes

Traitement antibiotique / antifongique :

☐ Non
☐ A débuter après le prélèvement
 Nom :
☐ En cours
 Date de début :/...../.....
 Durée du traitement :jours
 Nom :
☐ Post traitement
 Date d'arrêt :/...../.....
 Nom :

CONFORMITÉ DU PRÉLÈVEMENT - FACULTATIF (CADRE RESERVÉ AU LABORATOIRE)

Date et heure de réception de l'échantillon :/...../.....h..... Prélèvement conforme : ☐ Oui ☐ Non
 Visa du vérificateur :

1 PRÉPARATIFS

SCANNEZ POUR VOIR
LA VIDÉO EXPLICATIVE



- Lavez-vous les mains avant de commencer.
- Saisissez l'écouvillon en le tenant entre le pouce et l'index

Ne touchez pas l'embout cotonneux et ne posez pas l'écouvillon. Ne touchez pas la zone entre le trait rouge et l'embout cotonneux pour ne pas le contaminer. Si vous posez ou laissez tomber l'écouvillon ou que vous touchez l'embout cotonneux, demandez un nouveau kit de prélèvement.



2 AUTO-PRÉLÈVEMENT

- Écartez les jambes, écartez les grandes lèvres avec une main.

- Avec l'autre main, introduire l'écouvillon dans le vagin jusqu'à la marque rouge de la tige.

Uniquement sur 2 à 3 cm pour les femmes enceintes

- Tournez en le faisant bien toucher les parois pendant 10 à 30 secondes.

- Sortir l'écouvillon.

- Placez immédiatement l'écouvillon dans le tube de transport.
L'écouvillon se casse facilement au niveau de la marque rouge en coudant l'écouvillon sur le rebord du tube

- Assurez vous que le tube de transport soit correctement fermé.



3 IDENTIFICATION

- **Identifiez le tube** avec votre nom, prénom, date de naissance et **complétez la feuille** au recto.

- **Ramenez le kit** dans les 24h à votre laboratoire Biogroup le plus proche.

